

IMPFKALENDER

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach den
Empfehlungen der Sächsischen Impfkommision (SIKO)

Lebensalter Impfung gegen

ab 6 Wochen	Rotaviren , 2- bzw. 3-malige Schluckimpfung (je nach Impfstoff)
ab 2 Monaten	Beginn der Grundimmunisierung gegen: Diphtherie (D) , Keuchhusten (Pa) , Tetanus (T) Haemophilus-influenzae-Typ b (Hib) Kinderlähmung (IPV) Hepatitis B (HBV) Meningokokken B (bis 25 Jahre) Meningokokken ACWY (bis 25 Jahre) Pneumokokken (bis 23 Monate)
ab 6 Monaten	Virusgrippe (Influenza) jährlich
ab 11 Monaten	Masern-Mumps-Röteln (MMR) Varizellen (Windpocken)

VON MENSCH ZU MENSCH.

Herausgeber: Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
www.sms.sachsen.de, www.gesunde.sachsen.de

Stand: 15.02.2024, **Bezug:** www.publikationen.sachsen.de

Lebensalter Impfung gegen

ab 12 Monaten (ab 1 Jahr)	Grundimmunisierung gegen: D, Pa, T, Hib, IPV, HBV, Pneumokokken, Meningokokken B und Meningokokken ACWY vervollständigen Hepatitis A und B
ab 14 bis 23 Monate	Masern-Mumps-Röteln (MMR), Varizellen (Windpocken)
ab 5 Jahren	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten, Auffrischungsimpfung
ab 9 Jahren	Masern-Mumps-Röteln (MMR), 3. MMR-Impfung nur bei Erstimpfung im Alter von unter einem Jahr sowie Erst- und Zweitimpfung bis zum Alter von unter vier Jahren
ab 9 Jahren bis 25 Jahre	Humane Papillomaviren (HPV), 2 oder 3 Impfungen (je nach Impfalter)
ab 10 Jahren	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa) und Kinderlähmung (IPV) Auffrischungsimpfung (Vierfach-Impfung) Meningokokken ACWY Auffrischungsimpfung
ab 50 Jahre	Herpes zoster (Gürtelrose)
ab 60 Jahre	Pneumokokken, Wiederholungsimpfung abh. vom Impfstoff COVID-19-Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfung mit Varianten-angepasstem Impfstoff
alle 10 Jahre	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa) und Kinderlähmung (IPV) Auffrischungsimpfung (Vierfach-Impfung)

Bitte holen Sie versäumte Impfungen frühestmöglich nach!

Einige von der SIKO empfohlene Impfungen sind keine Pflichtleistungen der Krankenkassen. Bitte fragen Sie bezüglich Kostenübernahme vor der Impfung bei Ihrer Krankenkasse nach.